ASPIRINA

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de **VENTA LIBRE**

La aspirina es un antiinflamatorio, analgésico, antipirético y antitrombótico. Está indicado para aliviar procesos dolorosos, inflamaciones de distinto tipo y estados febriles. Se lo utiliza para tratar numerosas condiciones inflamatorias y autoinmunes como la artritis juvenil, la artritis reumatoidea y la osteoartritis. También en otras situaciones que cursan con inflamación no reumática y dolor, como lesiones deportivas, esguinces musculares, torceduras, tendinitis, etc. Como antitrombótico se lo utiliza para prevenir y tratar trombosis venosas y arteriales. También se lo indica para prevenir y reducir el riesgo de infarto de miocardio y de situaciones isquémicas.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ Tomar este medicamento con las comidas o después de las comidas.
- ✓ No lo tome nunca con alcohol.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene antecedentes de úlcera péptica o duodenal u otra enfermedad inflamatoria intestinal.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene hemorragias o tendencia al sangrado.
- ✓ No utilice este medicamento si padece de alteraciones hepáticas o renales.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene antecedentes de rinitis, reacciones broncoespásticas o urticaria debidas al uso de otros antiinflamatorios no esteroides o si sabe que es alérgico al ácido acetilsalicílico.

Dosis y Administración:

Las dosis habituales son:
Como analgésico, antiinflamatorio y antipirético: 500 mg cada 6 u 8 horas según el cuadro clínico.
Como antitrombótico: 100 a 300 mg/día.

- Se aconseja tomar los comprimidos junto con las comidas para evitar molestias.
- Los comprimidos efervescentes y los sobres deben disolverse en medio vaso de agua.
- Los comprimidos masticables se pueden tomar con o sin bebidas.
- El tiempo de utilización debe ser tan corto como sea posible. Deben evitarse los tratamientos largos.
- En pacientes que reciban dosis elevadas en forma crónica, por indicación médica, deberán tomar la mayor parte de la dosis diaria de aspirina a la hora de acostarse, junto con algún alimento.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, **NO** duplique la dosis.
- ✓ Está contraindicada en pacientes hemofílicos, así como otras patologías que cursan con sangrado, como el dengue.
- ✓ Debe administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia hepática o renal, diabetes y gota.
- ✓ Debe usarse con precaución en pacientes inmunosuprimidos, ya que puede enmascarar los síntomas de una infección.
- ✓ Consulte a su médico y/ó farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud está embarazada, sobre todo en los últimos meses de gestación.
- ✓ Se recomienda no administrar este medicamento si está amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico u odontólogo que está tomando aspirina si tiene prevista alguna intervención quirúrgica o dental.
- ✓ Deben usarse dosis menores de aspirina en los pacientes geriátricos, ya que son más sensibles a los efectos adversos, posiblemente debido a una menor función renal.
- ✓ **No debe administrarse en menores de 16 años para el tratamiento de la fiebre ni de procesos virales. Tampoco como preventivo de molestias de vacunación. Su pediatra o farmacéutico le aconsejará qué medicamento puede utilizar en estas situaciones.**
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Siempre conserve los fármacos en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No tome este medicamento si está medicado con anticoagulantes

Ante una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- *Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247*
- *Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777*
- *Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555*

www.cofa.org.ar

COFA
CONFEDERACIÓN FARMACÉUTICA ARGENTINA

FARMACIA