

FAMOTIDINA

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La famotidina, junto con el carbonato de calcio y el hidróxido de magnesio, actúa reduciendo el ácido producido por el estómago asociado con la indigestión ácida y el ardor estomacal producido principalmente por excesos en comidas y bebidas.

Se presenta en forma de comprimidos, comprimidos masticables y en sobres con polvo efervescente.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ Debe evitar los alimentos con picante y otros que contengan un alto contenido ácido como los tomates o los jugos de fruta.
- ✓ No lo tome nunca con alcohol.
- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico a la famotidina.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ No utilice este medicamento si le indicaron otro antiácido.

Dosis y administración:



- Las dosis habituales son: 2 tomas diarias de cualquiera de las presentaciones.
- Para prevenir los síntomas debe tomar este medicamento entre 15 y 60 minutos antes de las comidas o bebidas con gas.
- Ingiera los comprimidos enteros con un vaso de agua. No lo triture ni lo rompa.
- Disuelva las presentaciones efervescentes en agua antes de tomarla.
- Mastique bien las tabletas masticables antes de tragarlas y tómelas con un vaso de agua.
- El tiempo de utilización debe ser de no más de 7 días.
- Si no desaparecieron los síntomas consulte a su médico.
- En los pacientes con insuficiencia renal o hepática se debe adecuar la dosis.
- Aunque se sienta mejor, tome este medicamento por la totalidad del tratamiento indicado.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, NO duplique la dosis.
- ✓ Avise a su médico y /o a su farmacéutico si está tomando antiácidos.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene insuficiencia renal y/o hepática severa.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ No ingiera medicamentos delante de los niños y manténgalos fuera de su alcance.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.



Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA