

# PICOSULFATO DE SODIO

Ud. está llevando un  
**MEDICAMENTO** de **VENTA LIBRE**

El picosulfato de sodio es un fármaco que se emplea para el tratamiento del estreñimiento (laxante). Se presenta en forma de: cápsulas, cápsulas blandas, gotas, solución bebible y/o chicles.



## Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al picosulfato de sodio.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos.
- ✓ No utilice este medicamento en niños sin antes consultar con su pediatra.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.



## Dosis y administración:

Las dosis recomendadas en adultos son:

- **Cápsulas:** tomar 1 o 2 cápsulas con agua antes de ir a dormir.
- **Gotas:** poner 5 a 10 gotas en un poco de agua e ingerir por la noche. En casos severos se puede aumentar la dosis a 25 gotas por día.
- **Chicles:** mascar 1 a 2 chicles a la hora de acostarse. Es importante recordar que este producto no es una golosina sino un medicamento.
- Se aconseja no tomar picosulfato de sodio por más de 8 a 10 días.

## Advertencias y Precauciones:



- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si Ud. es alérgico al picosulfato de sodio o a otros medicamentos.
- ✓ Avise a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando.
- ✓ Tener en cuenta que su uso prolongado y en dosis elevadas puede producir pérdida de potasio o hipokalemia.
- ✓ No tome laxantes si tiene una úlcera gástrica activa, enfermedad de Crohn, síndromes dolorosos o abdominales sin el diagnóstico del médico, o si sufre obstrucción intestinal.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada o si está amamantando.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga este medicamento en su envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento a temperatura ambiente y en un lugar seco.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

**Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:**



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

[www.cofa.org.ar](http://www.cofa.org.ar)



FARMACIA