

RANITIDINA

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La ranitidina es un antiulceroso y antisecreto gástrico que actúa reduciendo la cantidad de ácido que produce el estómago. Se presenta en forma de comprimidos, comprimidos efervescentes y en sobres de granulado efervescente.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No tomar más comprimidos por día de los indicados.
- ✓ No lo tome nunca con alcohol
- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico a la ranitidina
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada o amamantando a su bebé
- ✓ No utilice este medicamento para aliviar los síntomas de mala digestión
- ✓ No utilice este medicamento si le indicaron antiácidos



Dosis y Administración:

Las dosis habituales son: 2 tomas de 150 mg o 1 sola toma de 300 mg

- Tomar este medicamento antes de las comidas y/o a la noche antes de ir a dormir.
- Si requiere 2 tomas, se tomará después del almuerzo y una hora antes de la cena.
- Ingiera este medicamento entero con un vaso de agua. No lo triture ni lo rompa.
- Disuelva las presentaciones efervescentes en agua antes de tomarlas.
- El tiempo de utilización debe ser de 7 días.
- Si no desaparecieron los síntomas consulte a su médico.
- Aunque se sienta mejor, tome este medicamento por la totalidad del tratamiento indicado.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Informe a su médico y/o farmacéutico si está consumiendo otros medicamentos.
- ✓ Si se olvida de tomar éste u otro medicamento, **NO** duplique la dosis.
- ✓ Avise a su médico y /o a su farmacéutico si está tomando antiácidos, sucralfato, ketoconazol.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si padece problemas renales y/o hepáticos.
- ✓ Consulte con su médico si tiene una enfermedad pulmonar crónica, diabetes o está inmunocomprometido.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de tomar este medicamento si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Trate de no tomar medicamentos en presencia de los niños. Mantenga éste y cualquier medicamento fuera de su alcance.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.



Ante una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:



- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247
- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA