

# LORATADINA

La loratadina es un antihistamínico indicado en el tratamiento sintomático y en el alivio temporal de los síntomas causados por las alergias respiratorias como la secreción nasal, estornudos, lagrimeo y picazón de ojos, nariz y/o garganta, y en casos de alergia de piel.

Se presenta en comprimidos, comprimidos recubiertos, de liberación prolongada y jarabe.



## Dosis y Administración:

**Adultos y mayores de 12 años:**

Comprimidos: 1 comprimido (10 mg) por día preferentemente por la mañana. No más de 1 comprimido en 24 horas.

Jarabe: 10 ml una vez al día.

**Niños menores de 6 años:** consultar con el pediatra.

Los comprimidos deben tragarse enteros; no deben fragmentarse, ni cortarse, ni trirurar con los dientes.

Este medicamento puede tomarse con o sin alimentos.

La duración del tratamiento no debe ser mayor a 5 días ininterrumpidos.

## Reacciones adversas:

Ocasionalmente puede producir cansancio, sedación y dolor de cabeza. En niños se ha observado nerviosismo.

## Precauciones y advertencias:

Informar al médico y al farmacéutico si es alérgico a la loratadina, a otros medicamentos o a cualquiera de los componentes del medicamento. Tener en cuenta si está tomando medicamentos para resfriados y/o alergias.

Se debe advertir que la presentación en comprimidos contiene lactosa, por lo tanto si el/la paciente padece una intolerancia a ciertos azúcares, debe consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

Como el jarabe contiene 0.6 g de sacarosa / ml de solución, se debe tener en cuenta en los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarosa y en pacientes diabéticos.

Se aconseja consultar al médico aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad hepática o renal. En estos casos se debe administrar una dosis inicial inferior porque pueden presentar una depuración más lenta de la loratadina, de ahí que la dosis recomendada es de 5mg/día o de 10 mg para los comprimidos y de 5 ml/día o de 10 ml para los jarabes en días alternos.

Si el/la paciente está tomando otro medicamento o está embarazada o está amamantando debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

## Interacciones:

Se puede observar un aumento en la concentración plasmática de loratadina, con posterioridad a la coadministración de loratadina con dosis terapéuticas de eritromicina, ketoconazol y cimetidina sin que se manifiesten cambios clínicos significativos.

Cabe señalar que las concentraciones plasmáticas de eritromicina disminuyen un 15% durante la administración simultánea con loratadina en relación con la observada con la administración de eritromicina sola.

Se debe suspender el tratamiento 48 horas antes de realizar cualquier tipo de prueba cutánea, ya que los antialérgicos pueden impedir o disminuir reacciones que podrían ser positivas.

## Contraindicaciones:

La hipersensibilidad o alergia conocida a algunos de los componentes de la fórmula.

No debe administrarse durante el embarazo y la lactancia, y a niños menores de 2 años de edad.

No debe administrarse en pacientes que padecen crisis asmáticas y enfermedad hepática o renal

## Sobredosificación:

Los síntomas de sobredosificación se caracterizan principalmente por una intensificación de los efectos farmacológicos del tipo somnolencia, cefalea, taquicardia, si bien con la ingesta única de 160 mg no se observaron efectos adversos.

NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
AEROTINA	loratadina	10 mg comp.x 10	Raffo
AEROTINA	loratadina	jbe.x 60 ml	Raffo
AEROTINA RAPIDA ACCION	loratadina	10 mg cáps.bl.x 28	Raffo
ALERCAS	loratadina	1 mg/ml jbe.x 60 ml	Casasco
ALERCAS	loratadina	10 mg comp.x 10	Casasco
ALERCAS	loratadina	1 mg/ml jbe.x 90 ml	Casasco
ALERFAST	loratadina	1 mg/ml jbe.x 90 ml	Roemmers
ALERFAST	loratadina	10 mg comp.x 30	Roemmers
ALERGIANO	loratadina	10 mg comp.rec.x 10	Northia
ALERGIPAN	loratadina	10 mg comp.x 10	Benitol
ALERGITRAT L	loratadina	10 mg comp.x 10	Fecofar
ALERMUC	loratadina	10 mg comp.x 10	Elisium
ALERPRIV	loratadina	comp.	Montpellier
ALERPRIV	loratadina	jbe	Montpellier
ALGISTOP	loratadina	comp.	ISA
BEDIX	loratadina	susp.x 60 ml	Laboratorios Ber
BEDIX	loratadina	comp.	Laboratorios Ber
BENADRYL 24	loratadina	comp.	Elea
BENADRYL 24 FLASH	loratadina	comp.	Elea
BILOINA	loratadina	jbe.	Andrómaco
BILOINA	loratadina	comp.	Andrómaco
BIOALER	loratadina	comp.	Gastón Giscard
CLARITYNE	loratadina	comp.	Schering-Plough
CLARITYNE	loratadina	jbe.	Schering-Plough
CLARITYNE	loratadina	Efer.comp.x 10	Schering-Plough
CLARITYNE FAST	loratadina	tab.disol.inst.x 8	Schering-Plough
DEVEDRYL	loratadina	jbe.	Klonal
DEVEDRYL	loratadina	10 mg comp.x 10	Klonal
DEXITIS	loratadina	10 mg comp.x 10	Fabop
EXCELENTIA ANTIALERGICO	loratadina	comp.x 10	Excelentia
FADA LORATADINA	loratadina	10 mg comp.x 10	Fada Pharma
HISPLEX	loratadina	1 mg/ml jbe.x 60 ml	Biotenk
HISPLEX	loratadina	10 mg comp.x 10	Biotenk
HISPLEX	loratadina	10 mg comp.x 30	Biotenk
HISPLEX	loratadina	10 mg comp.x 5	Biotenk
LAURUS	loratadina	5 mg jbe.x 60 ml	Sandoz
LAURUS	loratadina	comp.	Sandoz
LERTAMINE	loratadina	jbe.	Schering-Plough
LERTAMINE	loratadina	comp.	Schering-Plough
LERTAMINE FAST	loratadina	tab.	Schering-Plough
LERTAMINE REDITABS	loratadina	10 mg tab.disol.inst.x 8	Schering-Plough
LISALER	loratadina	jbe.x 60 ml	Fortbenton
LISALER	loratadina	comp.	Fortbenton
LOISAN	loratadina	comp.	Baliarda

NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
LORALIVIO	loratadina	10 mg comp.x 10	Fada Pharma
LORATADINA CEVALLOS	loratadina	10 mg comp.x 10	Cevallos
LORATADINA FABRA	loratadina	10 mg comp.x 30	Fabra
LORATADINA FECOFAR	loratadina	10 mg comp.x 10	Fecofar
LORATADINA FECOFAR	loratadina	susp.x 60 ml	Fecofar
LORATADINA ILAB	loratadina	10 mg comp.x 10	Inmunolab
LORATADINA INDECO	loratadina	jbe.x 60 ml	Indeco
LORATADINA INDECO	loratadina	comp.x 10	Indeco
LORATADINA LBA FARMA	loratadina	10 mg comp.x 10	Indeco
LORATADINA NORTHIA	loratadina	jbe.x 60 ml	Northia
LORATADINA NORTHIA	loratadina	10 mg comp.x 30	Northia
LORATADINA TAURO	loratadina	10 mg comp.x 10	Laboratorios Tau
LORATADINA VANNIER	loratadina	jbe.x 60 ml	Vannier
LORATADINA VANNIER	loratadina	10 mg comp.x 10	Vannier
LORATEX	loratadina	10 mg comp.x 10	Litex
LORATEX SOLUCION	loratadina	fco.	Litex
LORATINE	loratadina	10 mg comp.x 7	Investi
LOREMEX ANTIALERGICO	loratadina	10 mg comp.x 10	Phoenix
MEGALORAT	loratadina	10 mg comp.x 10	Indeco
MUDANTIL L	loratadina	comp.x 30	Géminis F.
NASTIZOL ANTIALERGICO	loratadina	comp.x 60	Bagó
NASTIZOL ANTIALERGICO	loratadina	jbe.x 120 ml	Bagó
NEGALERG L	loratadina	comp.	Valeant Argentin
NEGALERG L	loratadina	jbe.	Valeant Argentin
NILTRO	loratadina	10 mg comp.x 10	Duncan
NOVO-VAGRAN	loratadina	jbe.x 60 ml	Finadiet
NOVO-VAGRAN	loratadina	comp.	Finadiet
NULAREF	loratadina	jbe.x 60 ml	Lafedar
NULAREF	loratadina	comp.	Lafedar
NULAREF	loratadina	comp.x 30	Poen
OMEGA 100 L	loratadina	comp.x 10	Omega
OMEGA 100 L	loratadina	jbe.x 60 ml	Omega
PULMOSAN ALLER	loratadina	comp.	E.J.Guzzi
PULMOSAN ALLER	loratadina	jbe.x 60 ml	E.J.Guzzi
REFENAX ANTIALERGICO	loratadina	10 mg comp.x 10	Monserrat
SINALER	loratadina	10 mg comp.x 10	Cassará
SINALER	loratadina	jbe.x 50 ml	Cassará
STAIMIR	loratadina	comp.x 10	Volpino
TABCIN ALERGIA	loratadina	10 mg comp.x 10	Bayer Consumer
VAGRAN	loratadina	10 mg comp.x 20	Finadiet
VAGRAN	loratadina	jbe.	Finadiet
VIXIDONE L	loratadina	jbe.x 60 ml	Valeant Argentin
VIXIDONE L	loratadina	comp.x 10	Investi

[www.cofa.org.ar](http://www.cofa.org.ar)

