

PICOSULFATO DE SODIO

El picosulfato de sodio es un laxante de contacto de acción directa sobre el tono y el peristaltismo del intestino grueso, con buena efectividad. Dado que en las dosis utilizadas no es absorbido por la pared intestinal, no produce efectos colaterales locales o sistémicos. Está indicado como laxante en la constipación intestinal; en el manejo preoperatorio y postoperatorio, en el embarazo, en geriatría y en aquellos pacientes que van a ser sometidos a estudios radiológicos y endoscópicos que requieren eliminar sombras por materia fecal o gases; en cirugía proctológica y en todos aquellos pacientes en quienes es necesario disminuir el esfuerzo de la defecación, como en el infarto del miocardio, en la insuficiencia cardíaca o respiratoria, en las hernias o en la hipertensión arterial. Se presenta en forma de cápsulas, cápsulas blandas, gotas, perlas, solución bebible y/o chicles.



Dosis y Administración:

Las dosis recomendadas son:

Cápsulas y perlas: Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 1 o 2 cápsulas con agua antes de ir a dormir.

Gotas:

Adultos y niños mayores de 12 años: 5 a 10 gotas en un poco de agua e ingerir por la noche. En casos severos se puede aumentar la dosis a 25 gotas por día

Niños menores de 12 años: consultar con el pediatra.

Chicles:

Adultos y niños mayores de 12 años: mascar 1 a 2 chicles a la hora de acostarse. Tener en cuenta que no es una golosina.

Niños menores de 12 años: consultar con el pediatra.

Solución bebible:

Adultos y niños mayores de 12 años: ½ a 2 cucharadas soperas al acostarse.

Niños menores de 12 años: consultar con el pediatra.

Se aconseja no tomar este medicamento por más de 8 a 10 días.

Reacciones adversas:

En general los efectos secundarios son poco frecuentes, pero en ocasiones la evacuación intestinal puede acompañarse de discreto dolor transitorio, tipo cólico.

Una de las principales reacciones adversas posibles es la pérdida hidroelectrolítica, principalmente de potasio, cuando el fármaco es utilizado en forma crónica.

Precauciones y advertencias:

No se aconseja la utilización prolongada de laxantes, ya que su empleo no debe exceder de 8 a 10 días de tratamiento.

No debe usarse en pacientes con enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal ni en niños menores de 4 años. La administración prolongada de altas dosis puede ocasionar pérdida de electrolitos como el potasio, la que a su vez puede producir alteraciones cardíacas y astenia muscular. Aumenta la sensibilidad a los glucósidos cardiotónicos.

No se aconseja su uso durante el embarazo y la lactancia.

Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no se debe tomar laxantes sin antes consultar al médico.

Interacciones:

Se observan interacciones con antiarrítmicos, sotalol, amiodarona y digitálicos.

Aumenta la pérdida de potasio ocasionada por otras drogas, como por ejemplo los diuréticos, la anfotericina B y los corticoides, ya sea solos o asociados.

Los antibióticos pueden reducir el efecto laxante.

Contraindicaciones:

Patologías gastrointestinales, como ser úlcera gástrica activa, síndrome abdominal agudo, oclusión intestinal e hipersensibilidad.

En colopatías orgánicas complementarias como la enfermedad de Crohn y la rectocolitis ulcerosa.

Sobredosificación:

Dolor espástico del abdomen inferior, con evacuaciones frecuentes. El tratamiento consiste en la administración de antiespasmódicos, como la atropina.

NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	LABORATORIO
AGAROL CHICLE	sodio,picosulfato	Elea
AGAROL CHICLE	sodio,picosulfato	Elea
AGAROL CHICLE	sodio,picosulfato	Interbelle Cosme
AGAROL CHICLE	sodio,picosulfato	Interbelle Cosme
AGAROL GELCAPS	sodio,picosulfato	Elea
AGAROL GELCAPS	sodio,picosulfato	Elea
AGAROL GELCAPS	sodio,picosulfato	Elea
AGAROL GELCAPS	sodio,picosulfato	Elea
CHICLE LAXANTE LABSA	sodio,picosulfato	Labsa
CHICLE LAXANTE LABSA	sodio,picosulfato	Labsa
CIRULAXIA	sodio,picosulfato	Takeda
CIRULAXIA	sodio,picosulfato	Takeda
CIRULAXIA	sodio,picosulfato	Takeda
DAGOL CETUS	sodio,picosulfato	Cetus
DAGOL CETUS	sodio,picosulfato	Cetus
DULCOLAX	sodio,picosulfato	Boehringer Ingel
DULCOLAX	sodio,picosulfato	Boehringer Ingel
DULCOLAX PERLAS	sodio,picosulfato	Boehringer Ingel
FACTOR LAXANTE ILAB	sodio,picosulfato	Inmunolab
FEEN A MINT	sodio,picosulfato	Interbelle Cosme
FEEN A MINT	sodio,picosulfato	Elea
FEEN A MINT	sodio,picosulfato	Elea
FEEN A MINT	sodio,picosulfato	Interbelle Cosme
FEEN A MINT EXPENDEDOR	sodio,picosulfato	Elea
GOTALAX	sodio,picosulfato	Mertens
GOTALAX	sodio,picosulfato	Mertens
GRANULAX CHICLES	sodio,picosulfato	Lacefa
GRANULAX CHICLES	sodio,picosulfato	Lacefa
GRANULAX EFERVESCENTE	sodio,picosulfato	Lacefa
GRANULAX EFERVESCENTE	sodio,picosulfato	Lacefa
KRITEL	sodio,picosulfato	Monserrat
KRITEL	sodio,picosulfato	Monserrat
KRITEL	sodio,picosulfato	Monserrat
KRITEL EMULSION	sodio,picosulfato	Monserrat
LAXAGAR	sodio,picosulfato	Wunder Pharm
LAXAMIN	sodio,picosulfato	Temis-LostalAC
MODATON	sodio,picosulfato	Montpellier
MODERNEL	sodio,picosulfato	Phoenix
OPALINO CHICLE	sodio,picosulfato	Weltrap
OPALINO CHICLE	sodio,picosulfato	Weltrap
OPALINO CHICLE	sodio,picosulfato	Weltrap
OPALINO GOTAS	sodio,picosulfato	Weltrap
PERLAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Volpino
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Volpino
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
RAPILAX	sodio,picosulfato	Elea
TRALI	sodio,picosulfato	AstraZeneca
VERILAX	sodio,picosulfato	Laboratorios Ber
YODOLIN FERRIER	sodio,picosulfato	Fada Pharma

www.cofa.org.ar

