

PIROXICAM

El piroxicam es un antiinflamatorio que pertenece al grupo de medicamentos denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Este fármaco actúa inhibiendo a la enzima ciclo-oxigenasa, dando lugar así a una disminución de la formación de los precursores de las prostaglandinas y de los tromboxanos a partir del ácido araquidónico, que son los que causan dolor, fiebre e inflamación.

El piroxicam se usa para aliviar los síntomas causados por la artrosis, la artritis reumatoidea, la osteoartritis y la espondilitis anquilosante. También está indicado en la inflamación no reumática como bursitis, tendinitis, esguince, luxaciones, contracturas y en todos aquellos procesos que requieran una acción analgésica y antiinflamatoria.

Se presenta en comprimidos, comprimidos sublinguales y comprimidos recubiertos.



Dosis y Administración:

La posología se deberá ajustar, a criterio médico, según la intensidad del dolor y a las necesidades de cada paciente.

Dosis para artritis reumatoidea, osteoartritis y espondilitis anquilosante: 20 mg /día.

Dosis para las dolencias musculoesqueléticas agudas: 40 mg /día durante 2 días en dosis única o fraccionada.

Dosis de mantenimiento: 20 mg/día durante 7 a 14 días.

Reacciones adversas:

Las reacciones adversas más frecuentes son: náuseas, dispepsia, vómitos, mareos, cefalea, diarrea o estreñimiento, rash cutáneo, urticaria. Según la duración del tratamiento y el estado del paciente, el piroxicam disminuye la agregación plaquetaria, prolonga el tiempo de coagulación y produce aumento de las transaminasas plasmáticas. En estos casos se pueden corregir los efectos del piroxicam ya sea disminuyendo la dosis o suspendiendo la droga si los mismos persisten.

Precauciones y advertencias:

Informar al médico y al farmacéutico si es alérgico al piroxicam, al ácido acetilsalicílico, a otros AINEs o a otros medicamentos.

Se aconseja consultar al médico aquellos pacientes con antecedentes cardiovasculares, con ataques cerebrales así como los que padecen alguna enfermedad gástrica, hepática o renal.

Si la paciente está embarazada o está amamantando debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

No se recomienda su uso en analgesia obstétrica, debido a que por su efecto inhibitor de la síntesis de prostaglandinas pueden disminuir las contracciones uterinas y modificar la circulación fetal.

Si el paciente nota algún mareo, vértigo, alteraciones de la visión o sueño mientras está tomando piroxicam es aconsejable que no conduzca ni maneje maquinarias hasta que estos síntomas desaparezcan.

Previo a cualquier cirugía, incluida la dental, se debe informar al médico y/o al dentista que está tomando piroxicam.

Debe evitarse la exposición prolongada a la luz solar, ya que el piroxicam puede hacer a la piel más sensible a la luz solar.

No se debe consumir alcohol mientras se está tomando piroxicam porque el alcohol puede aumentar el riesgo de sangrado del estómago que causa este medicamento en tratamientos prolongados.

Se debe tener en cuenta que la presentación en comprimidos contiene lactosa, por lo tanto si el/la paciente padece una intolerancia a ciertos azúcares, debe consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

Interacciones:

Antes de tomar piroxicam informe a su médico o farmacéutico qué medicamentos está tomando, ya que éstos pueden interactuar entre sí.

Se aconseja no administrar en pacientes tratados con altas dosis de salicilatos. Al igual que otros AINEs, el piroxicam puede aumentar los niveles sanguíneos de litio cuando se administran conjuntamente.

El uso de piroxicam en pacientes tratados con metotrexate puede disminuir la depuración del metotrexate y aumentar su concentración plasmática.

Tampoco es conveniente asociar el piroxicam con heparina o anticoagulantes orales, debido a la acción de este fármaco sobre la agregación plaquetaria.

Contraindicaciones:

La hipersensibilidad o alergia a este principio activo, a otros antiinflamatorios, incluyendo el ácido acetilsalicílico o a algunos de los componentes de la fórmula.

No debe administrarse en niños ni en personas mayores de 80 años.

Debido a que la administración de medicamentos del tipo de piroxicam se ha asociado a un aumento del riesgo de sufrir anomalías congénitas/abortos no se recomienda la administración del mismo durante el primer y segundo trimestre del embarazo, salvo que se considere estrictamente necesario. Está contraindicado en el tercer trimestre del embarazo.

No se recomienda su uso durante el período de lactancia, ya que el piroxicam puede pasar en pequeña cantidad a la leche materna.

No debe administrarse en pacientes con asma, úlcera gastroduodenal y/o con insuficiencia renal o hepática severa.

Sobredosificación:

Los síntomas de una sobredosis de piroxicam pueden ser: náusea, vómito, dolor de estómago, somnolencia, heces fecales negras o con sangre, tos con sangre, dificultad para respirar y/o desmayos. Se aconseja concurrir al centro asistencial más cercano.

NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
FADA PIROXICAM	<i>piroxicam</i>	20 mg caps.	Fada Pharma
PIROXICAM	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.rec.	D.Sam-L.Chile
PIROXICAM 20 MG SHEIK	<i>piroxicam</i>	comp.	Mar
PIROXICAM BIOL	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Biol
PIROXICAM BIOTIC	<i>piroxicam+amoxicilina</i>	comp.	Dupomar
PIROXICAM BIOTIC MAR	<i>piroxicam+amoxicilina</i>	comp.	Mar
PIROXICAM BOUZEN	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Bouzen
PIROXICAM BOUZEN	<i>piroxicam</i>	10 mg comp.	Bouzen
PIROXICAM CBA	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Córdoba
PIROXICAM CREMA GEL	<i>piroxicam</i>	pomo	Dupomar
PIROXICAM DUPOMAR	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Dupomar
PIROXICAM MEDIPHARMA	<i>piroxicam</i>	10 mg caps.	Medipharma
PIROXICAM MEDIPHARMA	<i>piroxicam</i>	20 mg caps.	Medipharma
PIROXICAM ORIENTAL	<i>piroxicam</i>	20 mg caps.	Oriental
PIROXICAM PHARMA	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Pharma del Plata
PIROXICAM RELAX	<i>piroxicam+asoc.</i>	comp.	Dupomar
PIROXICAM RIGO	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Rigo
PIROXICAM RIGO	<i>piroxicam</i>	a.x 3 x 5 ml	Rigo
PIROXICAM VANNIER	<i>piroxicam</i>	20 mg comp.	Vannier

www.cofa.org.ar

