

AMBROXOL (Adultos)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El ambroxol es un mucolítico y expectorante que se emplea para el alivio sintomático del catarro bronquial. Se presenta en forma de cápsulas blandas, granulado o jarabe.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento durante el primer trimestre del embarazo.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.
- ✓ El ambroxol está contraindicado en los pacientes con úlcera péptica.

Dosis y administración:

- **Cápsulas blandas:** 1 comprimido de 30 mg cada 8 horas.
 - **Granulado:** 1 sobre de 60 mg cada 12 horas disuelto en un vaso con agua.
 - **Jarabe:** 10 ml cada 8 horas.
- Se aconseja tomar durante o después de las comidas.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Administrar con precaución si tiene insuficiencia hepática o renal grave.
- ✓ No se debe administrar a pacientes con úlcera gastroduodenal o enfermedades gastrointestinales.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada. No se recomienda la administración de ambroxol durante el primer trimestre del embarazo.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Si al cabo de 5 días los síntomas continúan, se aconseja acudir al médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar




FARMACIA

AMBROXOL (Niños)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El ambroxol es un mucolítico y expectorante que se emplea en las enfermedades broncopulmonares. Está indicado para el alivio sintomático del catarro bronquial. Se presenta en forma de jarabe



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento sin consultar con su pediatra



Dosis y administración:

- Niños de 2 a 6 años: 2.5 ml cada 8 horas
 - Niños de 6 a 12 años: 5 ml cada 8 horas
 - Niños mayores de 12 años: 10 ml cada 8 horas
- Se recomienda administrar el jarabe durante las comidas.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ No se debe administrar en niños menores de 2 años.
- ✓ Avise a su pediatra y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA