

# BISACODILO

Ud. está llevando un  
**MEDICAMENTO** de VENTA LIBRE

El bisacodilo es un laxante que se emplea para el tratamiento del estreñimiento y en la preparación para procedimientos radiológicos y cirugía.

Se presenta en forma de grageas o comprimidos.



## Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento si es alérgico al bisacodilo.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos.
- ✓ No utilice este medicamento si padece de deshidratación severa.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene hemorragias gastrointestinales.
- ✓ No utilice este medicamento si tiene inflamación u obstrucción intestinal.
- ✓ No utilice este medicamento en niños sin antes consultar con su pediatra.
- ✓ No utilice este medicamento si está embarazada.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.



## Dosis y administración:

Las dosis recomendadas son:

- **Grageas:**  
*Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 1 o 2 grageas con agua por la noche. Se advierte que las grageas no deben ingerirse junto con antiácido y/o leche.*
- **Comprimidos:**  
*Adultos y niños mayores de 12 años: tomar 1 o 2 comprimidos con agua por la noche. Se deben ingerir enteros, sin masticar.*

## Advertencias y Precauciones:

- ✓ Se aconseja no tomar este medicamento por más de 5 días.
- ✓ Tenga en cuenta que su uso prolongado y en dosis elevadas puede producir un desequilibrio de los electrolitos y pérdida de potasio o hipokalemia.
- ✓ Informe a su médico y/o a su farmacéutico si Ud. es alérgico al bisacodilo o a otros medicamentos.
- ✓ Informe a su médico y/o a su farmacéutico qué medicamentos con o sin prescripción está tomando.
- ✓ No tome laxantes si tiene obstrucción intestinal, cuadros abdominales agudos como apendicitis, enfermedades inflamatorias agudas del intestino, dolor abdominal severo asociado con náuseas y vómitos.
- ✓ Se recomienda en los adultos mayores o los pacientes debilitados ingerir líquidos y sales minerales mientras estén en tratamiento con bisacodilo para evitar problemas de deshidratación.
- ✓ Si Ud. está tomando antiarrítmicos, diuréticos y/o corticoides consulte a su médico antes de tomar este medicamento.
- ✓ Consulte a su médico y/o a su farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada o si está amamantando.
- ✓ Conserve este medicamento a temperatura ambiente y en un lugar seco. No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor y la humedad pueden deteriorar el medicamento.
- ✓ Mantenga este medicamento en su envase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.



**Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:**



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

[www.cofa.org.ar](http://www.cofa.org.ar)



FARMACIA