

CLOPIDOGREL

El clopidogrel es un antitrombótico y antiplaquetario que se administra para prevenir la formación de coágulos o trombos en los vasos sanguíneos endurecidos, un proceso conocido como aterotrombosis y que puede provocar efectos aterotrombóticos, como infarto cerebral, infarto de miocardio o muerte.

El clopidogrel pertenece al grupo de medicamentos denominados antiagregantes plaquetarios. Las plaquetas son células muy pequeñas que se encuentran en la sangre. Estas se agregan cuando la sangre se coagula, por lo tanto los antiagregantes plaquetarios al prevenir dicha agregación, reducen la posibilidad de que se produzcan coágulos sanguíneos. Este medicamento se presenta en comprimidos.



Dosis y Administración:

Adultos:

La dosis recomendada es de 1 comprimido 75 mg por día.

Este medicamento puede tomarse con las comidas o alejado de ellas; ya que los alimentos no influyen en su acción.

En los pacientes que hayan presentado o presenten angina inestable o infarto se les indica 1 comprimido de clopidogrel de 300mg o 4 comprimidos de 75 mg para que los tome una única vez al inicio del tratamiento. Después, la dosis normal es de 75 mg diarios.

No es necesario ningún ajuste de dosis en pacientes ancianos o con afecciones renales.

Reacciones adversas:

La hemorragia es el efecto más frecuente que se notifica con el clopidogrel y ésta puede aparecer en el estómago o intestino, hematomas (sangrado anormal o moretones bajo la piel) hemorragia nasal, sangre en orina. También se han notificado un número reducido de casos de hemorragia de los vasos sanguíneos de los ojos, hemorragia intracraneal, pulmonar o de articulaciones.

Otros efectos adversos frecuentes que se pueden observar en algunos pacientes son: diarrea, dolor abdominal, indigestión o ardor.

Se han reportado efectos adversos poco frecuentes, tales como: dolor de cabeza, úlcera de estómago, vómitos, náuseas, estreñimiento, erupciones, escozor, mareos, sensación de hormigueo y/o entumecimiento. En raras ocasiones se ha observado vértigo, confusión y/o alucinaciones.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave, informe a su médico o a su farmacéutico.

En algunos pacientes en tratamiento con clopidogrel se les ha detectado un incremento de las enzimas hepáticas, así como hiperbilirrubinemia e hígado graso.

Precauciones y advertencias:

También está contraindicada la administración de clopidogrel en aquellos pacientes con hipersensibilidad conocida a algunos de los componentes de la fórmula farmacéutica.

Se advierte que es posible que cuando el paciente se corta o sufre una herida, detener la hemorragia puede tardar más de lo normal. Esto está relacionado con el mecanismo de acción del clopidogrel, ya que previene la capacidad de la sangre para formar coágulos.

El clopidogrel se debe utilizar con cuidado en pacientes propensos al sangrado por traumas, úlceras u otras condiciones patológicas que predispongan a sufrir hemorragias internas como hemorragias en órganos o articulaciones del organismo.

Al igual que con otros agentes antiagregantes plaquetarios, el clopidogrel debe ser utilizado con precaución en pacientes con afección hepática severa y en aquellos con riesgo de sangrado inducido por aspirina y otros antiinflamatorios.

En caso de cirugía médica u odontológica, si durante estas intervenciones no se desea un efecto antiplaquetario, se deberá suspender la medicación por lo menos 7 días antes.

Se aconseja no administrar castaño de las Indias a los pacientes bajo tratamiento con clopidogrel, ya que puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Se recomienda no utilizar este medicamento durante el embarazo. Y también es aconsejable interrumpir la lactancia, si la paciente está medicada con clopidogrel.

Se debe tener en cuenta que algunas preparaciones de clopidogrel contienen lactosa entre sus componentes, de ahí que los pacientes que padecen una intolerancia a la lactosa deberán consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

Otro de los componentes de la formulación de clopidogrel es el aceite de ricino hidrogenado, por lo que se debe advertir que los pacientes pueden tener molestias estomacales y diarrea.

Interacciones:

El clopidogrel no debe ser administrado junto con anticoagulantes orales y/o con antiinflamatorios no esteroides. En pacientes con angina inestable o infarto de miocardio se suele prescribir clopidogrel en combinación con ácido acetil-salicílico (500 mg 2 veces al día en 24 horas), lo que no ocasiona problemas. Sin embargo, en el uso prolongado de ambos fármacos puede observarse que el clopidogrel potencia el efecto de la aspirina.

Contraindicaciones:

El clopidogrel está contraindicado en cualquier paciente con hemorragias patológicas tales como las hemorragias gastrointestinales, hemorragias retinales o hemorragias intracraneales.

Tampoco deben tomar este medicamento aquellos pacientes con enfermedades hepáticas y renales graves.

No está indicada la administración de clopidogrel a niños y adolescentes.

Sobredosificación:

Ante una eventual sobredosificación se debe concurrir al hospital más cercano o comunicarse con un centro de toxicología, ya que existe un mayor riesgo de hemorragia.

NOMBRE	P. ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
ANTIPLAQ	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Richmond
ARICLOPIN	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Ariston
CLODIAN	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Sandoz
CLODREL	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Baliarda
CLOPIDOGREL NORTHIA	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Northia
CLOPIDOGREL RICHET	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Richet
CLOPIDROGEL ROSPAW	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Rospaw
CLOPILEP	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Lepetit
ISCOVER	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Bristol
NABRATIN	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Raffo
NADENEL	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Géminis Farmacéu
NEFAZAN	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Phoenix
PLATACA	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Sidus
PLAVIX	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Sanofi Aventis
PLEYAR	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Casasco
TOKEN	<i>Clopidogrel</i>	<i>Comprimidos</i>	Bagó