

IODOPOVIDONA

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La iodopovidona es un antiséptico y desinfectante que mediante la liberación lenta de yodo, actúa sobre bacterias, virus y hongos, ejerciendo su acción germicida. No tiene acción irritante local y es atóxico.

Se la indica para la desinfección de heridas pre y postquirúrgicas, así como para el lavado y desinfección de quemaduras superficiales, heridas leves y afecciones microbianas de la piel.

Se presenta en forma de solución, aerosol, jabón líquido y jabón sólido.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar en caso de hipersensibilidad a la iodopovidona.
- ✓ No utilizar si tiene hipotiroidismo manifiesto.
- ✓ No utilizar en niños menores de 1 mes.
- ✓ No utilizar simultáneamente con otros antisépticos.

Dosis y administración:

- Usar la solución o rociar con el spray en forma homogénea sobre la herida no sangrante desde una distancia aproximada de 10 cm. Se debe esperar un lapso breve hasta que la solución se haya secado, antes de volver aplicarla.
 - **Uso hospitalario:** La solución y el jabón líquido se usan para la antisepsia del campo quirúrgico, desinfección de quirófanos, salas de parto, terapia intensiva, de habitaciones así como de instrumental.
- El jabón sólido se emplea en el lavado antiséptico del personal médico y de enfermería y como antisepsia pre-operatoria.
- **Usos en el hogar:** Lavado y desinfección de heridas, quemaduras y picaduras de insectos. Infecciones micóticas de uñas, manos y pies. Aplicar sin diluir. El jabón líquido se emplea para la desinfección de ropa de cama, vestimenta, pañales y otras prendas. También se lo usa para desinfectar pisos, paredes, sanitarios y vajilla. El jabón sólido se utiliza para la higiene corporal de niños y adultos. Su poder germicida le brinda también una acción desodorante.



Advertencias y Precauciones:



- ✓ La exposición prolongada puede causar irritación o raramente reacciones cutáneas severas.
- ✓ No calentar la solución previo a su aplicación.
- ✓ Ante enrojecimiento, dolor persistente o en caso de una infección, discontinuar el uso y consultar a su médico.
- ✓ Consultar con su médico y/o farmacéutico antes de usarlo si Ud. está embarazada o amamantando a su bebé.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.

Ante una sobredosisificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA

AMBROXOL (Adultos)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El ambroxol es un mucolítico y expectorante que se emplea para el alivio sintomático del catarro bronquial.
Se presenta en forma de cápsulas blandas, granulado o jarabe.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento durante el primer trimestre del embarazo.
- ✓ No utilice este medicamento si está amamantando a su bebé.
- ✓ El ambroxol está contraindicado en los pacientes con úlcera péptica.

Dosis y administración:

- **Cápsulas blandas:** 1 comprimido de 30 mg cada 8 horas.
 - **Granulado:** 1 sobre de 60 mg cada 12 horas disuelto en un vaso con agua.
 - **Jarabe:** 10 ml cada 8 horas.
- Se aconseja tomar durante o después de las comidas.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Administrar con precaución si tiene insuficiencia hepática o renal grave.
- ✓ No se debe administrar a pacientes con úlcera gastroduodenal o enfermedades gastrointestinales.
- ✓ Consulte a su médico y/o farmacéutico antes de utilizar este medicamento si Ud. está embarazada. No se recomienda la administración de ambroxol durante el primer trimestre del embarazo.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Si al cabo de 5 días los síntomas continúan, se aconseja acudir al médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos, ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosis, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar




FARMACIA

AMBROXOL (Niños)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

El ambroxol es un mucolítico y expectorante que se emplea en las enfermedades broncopulmonares. Está indicado para el alivio sintomático del catarro bronquial. Se presenta en forma de jarabe



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento sin consultar con su pediatra



Dosis y administración:

- Niños de 2 a 6 años: 2.5 ml cada 8 horas
 - Niños de 6 a 12 años: 5 ml cada 8 horas
 - Niños mayores de 12 años: 10 ml cada 8 horas
- Se recomienda administrar el jarabe durante las comidas.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ No se debe administrar en niños menores de 2 años.
- ✓ Avise a su pediatra y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA

