

LOPERAMIDA

La loperamida es un antidiarreico que se utiliza para el tratamiento sintomático de la diarrea aguda inespecífica y de la diarrea crónica asociada con la enfermedad intestinal inflamatoria. Este fármaco actúa reduciendo la motilidad intestinal por efecto directo sobre las terminaciones nerviosas o los ganglios intramurales que forman parte del sistema parasimpático. La loperamida puede ejercer su acción antidiarreica no solo mediante el retraso del tránsito intestinal y el aumento del tiempo de contacto, sino también por inhibición directa de la secreción de líquidos y electrolitos o la estimulación de la absorción de sal y de agua. Se indica también para reducir el volumen de descarga en ileostomías, colostomías y otras resecciones intestinales. Se presenta en solución de 2 mg/ml y comprimidos.



Dosis y Administración:

Adultos y niños mayores de 12 años:

En diarrea aguda: Comprimidos de 2 mg. La dosis inicial recomendada es de 4 mg (2 comprimidos) seguida por 2 mg (1 comprimido) diario luego de cada deposición líquida.

La dosis máxima es de: 16 mg/día

Solución oral: dosis inicial 4 medidas de 5 ml y posteriormente 2 medidas de 2 ml

Está absolutamente contraindicada en niños menores de 2 años.

En diarrea crónica:

La dosis promedio será de 4 a 8 mg/día (2 a 4 comprimidos) y puede continuarse por más de 10 días.

Si con una dosis máxima de de 16 mg/día no mejora la sintomatología de la diarrea luego de 10 días, es improbable que pueda controlarse con más días de tratamiento.

Niños

En diarrea aguda:

Comprimidos:

Para la dosis inicial se recomienda el siguiente esquema:

2 a 5 años (13-20Kg de peso): 1 mg 3 veces al día (dosis máxima 3 mg)

6 a 8 años (20-30Kg de peso): 2 mg 2 veces al día (dosis máxima 4 mg)

8 a 12 años (más de 30Kg de peso): 2 mg 3 veces al día (dosis máxima 6 mg)

La dosis de mantenimiento:

1 mg cada 10 kg de peso luego de una deposición líquida sin superar las dosis máximas indicadas.

Solución oral: 1 medida de 5 ml/ 10 Kg de peso/ día en 2 a 3 tomas.

2 a 5 años (13-20Kg de peso): 0.4 ml/Kg /día repartido en 3 tomas.

6 a 8 años (20-30Kg de peso): 1 medida de 5 ml 3 o 4 veces al día.

8 a 12 años (más de 30Kg de peso): 2 medidas de 5 ml hasta 4 veces al día.

En diarrea crónica:

No está establecida la dosis terapéutica de loperamida en diarrea crónica en niños.

Debe ser indicada por el gastroenterólogo infantil.

Reacciones adversas:

Las reacciones adversas más frecuentes son: distensión abdominal, constipación, somnolencia, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, mareos, rash cutáneo.

Precauciones y advertencias:

Informar al médico y al farmacéutico si es alérgico a la loperamida o a cualquiera de los componentes del medicamento.

En los pacientes con colitis ulcerosa se debe suspender de inmediato el tratamiento con loperamida, ante la aparición de distensión abdominal u otros síntomas que pudieran indicar megacolon tóxico inminente.

Se recomienda en los pacientes con diarrea aguda suspender el tratamiento con loperamida después de las 48 horas si no se observa mejoría. También se advierte que se debe suspender el uso de este fármaco en los pacientes con diarrea crónica si no mejoraron después de 10 días de tratamiento con la dosis máxima.

Se aconseja consultar al médico aquellos pacientes que padecen alguna enfermedad hepática.

Las mujeres embarazadas deben consultar a su médico antes de tomar este medicamento, ya que aun no se ha establecido la seguridad de la loperamida para su uso en mujeres embarazadas

Tampoco se recomienda el uso de loperamida a las mujeres en período de lactancia.

No se recomienda su uso en niños menores de 6 años. La terapia de rehidratación es el tratamiento de preferencia para los niños con diarrea, ya que la loperamida puede enmascarar la deshidratación y la disminución de electrolitos.

Se debe utilizar con precaución en los pacientes geriátricos, ya que puede enmascarar la deshidratación y la disminución de electrolitos, lo que trae aparejado un aumento en la variabilidad de la respuesta a la loperamida.

Se debe advertir que la presentación en comprimidos contiene lactosa, por lo tanto si el/la paciente padece una intolerancia a ciertos azúcares, debe consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

Interacciones:

El uso simultáneo de loperamida con un analgésico opiáceo puede aumentar el riesgo de constipación severa.

El uso concurrente de loperamida y ritonavir o quinidina incrementa 2 a 3 veces los niveles plasmáticos de loperamida.

Contraindicaciones:

No se debe administrar ante hipersensibilidad al principio activo y/o algunos componentes del medicamento.

Está contraindicado el uso de loperamida en la colitis severa y en la diarrea asociada con colitis pseudomembranosa resultante del tratamiento con antibióticos de amplio espectro.

Se debe evitar su uso en aquellos pacientes en quienes debe evitarse la constipación.

No deben tomar loperamida los pacientes que presentan estreñimiento súbito y/o distensión abdominal.

No usar este medicamento en aquellos pacientes que tengan presencia de sangre en las heces y fiebre elevada (superior a 38 °C).

Está absolutamente contraindicada en niños menores de 2 años.

No se recomienda administrar loperamida a niños entre 2 y 6 años, a menos que sea indicado por un gastroenterólogo infantil y bajo supervisión continua.

Sobredosificación:

Los síntomas de sobredosis de loperamida reflejan generalmente irritación gastrointestinal, constipación, puede ocurrir íleo paralítico y depresión del SNC. El tratamiento orientativo consiste en administrar carbón activado rápidamente después de la ingesta.

Se aconseja concurrir al centro asistencial más cercano.

NOMBRE	PRINCIPIO ACTIVO	PRESENTACION	LABORATORIO
COLIFILM	Loperamida	Comp. 2mg.	Volpino
COLIFILM	Loperamida	Comp. 2mg.	Eurofarma
CUSTEY	Loperamida	Comp. 2mg.	Microsules Arg.
DOTALSEC	Loperamida	Comp. 2mg.	Fada Pharma
ELCOMAN	Loperamida	Comp. 2mg.	Sandoz
IONET	Loperamida	Comp. 2mg.	Cetus
LANSEKA	Loperamida	Comp. 2mg.	Investi
LEFAENTERILL	Loperamida	Comp. 2mg.	Fecofar
LOPERAMIDA CEVALLOS	Loperamida	Comp. 2mg.	Cevallos
LOPERAMIDA FABRA	Loperamida	Soluc. 2 mg/ ml	Fabfa
LOPERAMIDA FABRA	Loperamida	Comp. 2mg.	Fabfa
LOPERAMIDA FINADIET	Loperamida	Comp. 2mg.	Finadiet
LOPERAMIDA ILAB	Loperamida	Comp. 2mg.	Inmunolab
LOPERAMIDA RICHET	Loperamida	Comp. 2mg.	Richet
LOPERAMIDA VANNIER	Loperamida	Comp. 2mg.	Vannier
LOPERIX	Loperamida	Comp. 2mg.	Rospaw
LOVOPREN	Loperamida	Comp. 2mg.	Eczane
MINICAM	Loperamida	Comp. 2mg.	Gfamón
MINICAM	Loperamida	Comp. 2mg.	Sanofi-Aventis O
NORMASEC	Loperamida	Comp. 2mg.	Ronnet
PLEXOL	Loperamida	Comp. 2mg.	Sandoz
PLORINOC	Loperamida	Soluc. 2 mg/ ml	Klonal
PLORINOC	Loperamida	Comp. 2mg.	Klonal
REGULANE	Loperamida	Soluc. 2 mg/ ml	Finadiet
REGULANE	Loperamida	Comp. 2mg.	Finadiet
REGULANE AF	Loperamida	Comp. 2mg.	Finadiet
REGULANE SOLUCION	Loperamida	Soluc. 2 mg/ ml	Finadiet
SUPRASEC PLUS	Loperamida	Comp. 2mg.	Janssen-Cilag
VILTAR	Loperamida	Soluc. 2 mg/ ml	Dallas
VILTAR	Loperamida	Comp. 2mg.	Dallas

www.cofa.org.ar

