

BENZOCAINA 10% o 20% (Adultos)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La benzocaína es un anestésico local que está indicado para el alivio temporario del dolor de muelas o el ocasionado por la aparición de aftas, llagas y lesiones provocadas por los tratamientos de ortodoncia.
Se presenta en forma de gel.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar el gel si tiene antecedentes de alergia a la benzocaína o a otros anestésicos como procaína y butacaína.
- ✓ No usar el gel por más de 7 días.
- ✓ No se debe comer por una hora después de su aplicación.
- ✓ No se debe masticar chicles o alimentos mientras dure el adormecimiento

Dosis y administración:

- Para la administración del gel se pueden usar los dedos o un hisopo de algodón.
- Adultos y mayores de 12 años: se debe aplicar la cantidad necesaria del gel para cubrir adecuadamente la lesión o la zona afectada hasta 4 veces por día.
- Se puede aplicar con más frecuencia si las lesiones son muy molestas.
En las lesiones producidas por prótesis se debe retirar la misma, aplicar el gel de benzocaína y esperar hasta que el dolor o la molestia se haya calmado lo suficiente.
- Luego se debe enjuagar bien la cavidad bucal con agua natural y recién después se puede volver a colocar la prótesis.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Este gel solo se aplica en la mucosa oral y no puede ser aplicado en otras áreas del cuerpo.
- ✓ Si al cabo de los 7 días de tratamiento persisten los síntomas o empeoran, se debe consultar al odontólogo.
- ✓ Se aconseja no ingerir alimentos ni mascar chicles mientras persista el adormecimiento debido al riesgo de morderse la lengua o la mucosa bucal.
- ✓ Se debe evitar el contacto del gel con los ojos.
- ✓ En caso de contacto accidental con los ojos, se debe lavar con abundante agua durante 10 minutos.
- ✓ Avise a su médico y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.



Ante una sobredosisificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA

BENZOCAINA 2% (Niños)

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La benzocaína es un anestésico local que está indicado para el alivio temporario del dolor ocasionado por la aparición de la dentición en los bebés y para el tratamiento de la mucosa oral.
Se presenta en forma de gel.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No utilice este medicamento sin consultar con su pediatra.
- ✓ No aplique el gel en niños menores de 4 meses.
- ✓ No usar el gel si los niños son alérgicos a la benzocaína o a otros anestésicos como procaína y butacaína.
- ✓ No usar el gel por más de 7 días.



Dosis y administración:

- Para la administración del gel se pueden usar los dedos o un hisopo de algodón.

Las dosis son:

- **Niños mayores de 2 años:** se debe aplicar una fina capa del gel de benzocaína sobre la zona afectada hasta 4 veces por día o según lo indicado por el pediatra.
- **Niños menores de 2 años:** se debe administrar solo bajo indicación del pediatra.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ No se debe administrar en niños menores de 4 meses de edad.
- ✓ Este gel solo se aplica en la mucosa oral y no puede ser aplicado en otras áreas del cuerpo.
- ✓ Si tras los 7 días de tratamiento persisten los síntomas, se debe consultar al pediatra o al odontólogo.
- ✓ Se debe evitar el contacto del gel con los ojos.
- ✓ En caso de contacto accidental con los ojos, se debe lavar con abundante agua durante 10 minutos.
- ✓ Avise a su pediatra y/o a su farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.
- ✓ No lo guarde en el baño o en sitios húmedos ya que el calor o la humedad pueden deteriorar el medicamento.

Ante una sobredosis, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- **Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777**
- **Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555**

www.cofa.org.ar



FARMACIA