

CLORHEXIDINA

para uso bucal

Ud. está llevando un
MEDICAMENTO de **VENTA LIBRE**

La clorhexidina es un antiséptico bucal que se utiliza para el control de la placa bacteriana y de los gérmenes causantes de infecciones en la boca. Se la indica para el tratamiento sintomático de la inflamación de encías, úlceras bucales, así como en la halitosis o mal aliento. Se presenta en forma de colutorio y gel.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar en caso de hipersensibilidad a la clorhexidina.
- ✓ No usar con otros antisépticos.
- ✓ No tomar café o té inmediatamente después de usar la solución o el gel de clorhexidina, ya que puede provocar una pigmentación dental más intensa.
- ✓ No usar en niños menores de 3 años.
- ✓ Tampoco usar en niños que aun no tienen la capacidad para realizar enjuagues bucales.

Dosis y administración:

Colutorio

Adultos: Colocar 10 ml de la solución de clorhexidina en un vaso y enjuagar la boca con la misma durante 30 segundos 2 o 3 veces por día. Escupir después del enjuague.
No enjuagar con agua en forma inmediata ni ingerir alimentos ni masticar chicles hasta después de media hora del enjuague.
Niños: Realizar el mismo procedimiento con 5 ml de solución.

Gel

Adultos: Al retirar la tapa del pomo aproxime la punta del mismo sobre la zona a tratar. Presionar el pomo y dejar fluir una cantidad apropiada de gel para cubrir la zona afectada, según las indicaciones de su odontólogo. Repetir el procedimiento 2 a 3 veces por día.
Niños: Se debe realizar el mismo procedimiento, pero en general debe ser aplicado por un adulto, sobre todo en los niños pequeños.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Al principio del tratamiento pueden presentarse alteraciones del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.
- ✓ Se advierte que puede aparecer una coloración superficial del dorso de la lengua, en los dientes y en las prótesis. Pero esta coloración no es permanente y se evita con el cepillado dental.
- ✓ Avise a su odontólogo y/o farmacéutico si tiene cualquier otro problema médico.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con los Centros de Toxicología:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de asistencia Toxicológica La Plata - Tel: (0221) 451-5555

www.cofa.org.ar



FARMACIA