TETRAHIDROZOLINA CLORHIDRATO

Ud. está llevando un MEDICAMENTO
de VENTA LIBRE

La tetrahidrozolina clorhidrato es un descongestivo ocular que actúa aliviando y aclarando el enrojecimiento de los ojos de manera inmediata.
Este medicamento también calma el malestar y la irritación ocular leve causados, por ejemplo, por la exposición a humo, polvo, agua clorada, luz (ya sea solar, rayos ultravioleta (UV), luz de neón, como por pantallas de TV y computadora o por corrientes de aire, cosméticos, lentes de contacto, falta de descanso, entre otros.
Se presenta en forma de solución oftálmica estéril o como baño ocular.

Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar en caso de hipersensibilidad a tetrahidrozolina clorhidrato.
- ✓ No usar este medicamento si padece glaucoma de ángulo abierto o estrecho.
- ✓ Lavarse bien las manos antes de usar las gotas.
- ✓ El orificio del gotero no debe tocar el ojo ni ser tocado con las manos.
- ✓ En caso de usar lentes de contacto se deben quitar antes de cada aplicación y se pueden volver a colocar luego de 15 minutos.
- ✓ Cerrar correctamente el envase después de cada aplicación.
- ✓ No usar más de la dosis indicada ni modificar los intervalos de aplicación.
- ✓ No usar este medicamento si la solución cambia de color o se enturbia.
- ✓ Si está embarazada o en periodo de lactancia, consultar a su oftalmólogo antes de aplicarse este medicamento.
- ✓ Consultar al oftalmólogo infantil antes de usar este medicamento en niños menores de 6 años.

Dosis y administración:

- ***Solución oftálmica***

La dosis habitual es 1 a 2 gotas en el/los ojo/s afectados cada 6 horas.

- ***Baño ocular***

La dosis es de 1 a 2 aplicaciones diarias
Tener en cuenta que el efecto descongestivo es inmediato tras la administración y se mantiene de 4 a 6 horas.

Advertencias y Precauciones:

- ✓ Se aconseja que para prevenir la contaminación debe cuidarse de no tocar los párpados, pestañas y zonas anexas con el frasco gotero.
- ✓ Se advierte que pueden aparecer efectos no deseados como ardor, visión borrosa o picazón transitoria luego de aplicación.
- ✓ Antes de aplicarse las gotas, consulte a su oftalmólogo y/o a su farmacéutico si usa lentes de contacto o si alguna vez ha tenido alguna reacción alérgica a la tetrahidrozolina clorhidrato o a cualquier otra gota para los ojos.
- ✓ Se recomienda que si utiliza cualquier otro colirio, espere unos 15 minutos entre la aplicación de cada uno.
- ✓ Si tiene hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, enfermedades cardiovasculares o arterioesclerosis es aconsejable consultar a su oftalmólogo antes de utilizar este medicamento.
- ✓ Se aconseja suspender el uso del medicamento si aparece dolor ocular, alteración de la visión o si continúa con el ojo irritado.
- ✓ Se advierte que la sobredosificación o el uso prolongado de este medicamento puede producir un incremento del enrojecimiento o irritación ocular.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.
- ✓ Conserve este medicamento en lugar seco y al abrigo de la luz.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con:

- ***Hospital de Oftalmología Santa Lucía: Av. San Juan 1899, CABA - Teléfono: 011 4941-5555***
- ***Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze: Av. Juan B. Justo 4151, CABA - Teléfono: 011 4582-1278***

CoFA
www.cofa.org.ar

TU FARMACIA