

Supositorios de Glicerina Adultos

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La glicerina es un laxante para tratamientos de corta duración en caso de constipación. Los supositorios de glicerina constituyen un medio para desocupar rápidamente la última parte del intestino. Este medicamento está también indicado para la evacuación intestinal antes de la realización de estudios radiológicos.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la glicerina o a cualquiera de los componentes del producto.
- ✓ No utilizar los supositorios de glicerina por más de una semana.
- ✓ No usar este medicamento en pacientes con hemorroides, fisura anal o colitis hemorrágica.

Dosis y administración:

- **Constipación:**
Aplicar 1 supositorio para adultos y dejar actuar de 15 a 30 minutos.
No es necesario que el supositorio se disuelva completamente para que se produzca su efecto.
- **Constipación severa:**
Se puede repetir la aplicación de otro supositorio para adultos a los 30 a 60 minutos después de la primera aplicación.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Se advierte que solo debe ser usado por vía rectal y que puede causar ardor en la zona ano-rectal.
- ✓ Se aconseja consultar al médico ante un cuadro de constipación reciente no justificada por un cambio en el modo de vida.
- ✓ Se recomienda consultar al médico cuando la constipación va acompañada de dolor, fiebre, distensión de vientre, náuseas o vómitos.
- ✓ Se advierte que debe interrumpirse el tratamiento con los supositorios de glicerina y consultar al médico ante la aparición de sangre rectal o falla en obtener movimiento del intestino luego de la aplicación de este medicamento.
- ✓ Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.
- ✓ Conserve este medicamento por debajo de los 30 °C en el envase perfectamente cerrado.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.

Ante una sobredosificación, concurra al hospital más cercano o comuníquese con:



- Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555

CoFA
www.cofa.org.ar



TU FARMACIA

Supositorios de Glicerina Niños

Ud. está llevando un MEDICAMENTO de VENTA LIBRE

La glicerina es un laxante para tratamientos de constipación ocasional. Al igual que en los adultos, este medicamento está también indicado para la evacuación intestinal antes de la realización de estudios radiológicos.



Es importante tener en cuenta:

- ✓ No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la glicerina o a cualquiera de los componentes del producto.
- ✓ No utilizar los supositorios de glicerina por más de una semana sin consultar al pediatra.
- ✓ No usar este medicamento en pacientes con hemorroides, fisura anal o colitis hemorrágica.

Dosis y administración:

- **Constipación:**
Aplicar 1 supositorio para infantes y dejar actuar de 15 a 30 minutos.
No es necesario que el supositorio se disuelva completamente para que se produzca su efecto.

Advertencias y Precauciones:



- ✓ Se advierte que solo debe ser usado por vía rectal y que puede causar ardor en la zona ano-rectal.
- ✓ Se aconseja consultar al pediatra ante un cuadro de constipación reciente no justificada por un cambio en el modo de vida.
- ✓ Se recomienda consultar al pediatra cuando la constipación va acompañada de dolor, fiebre, distensión de vientre, náuseas o vómitos.
- ✓ Ante cualquier duda consulte a su pediatra y/o a su farmacéutico.
- ✓ Conserve este medicamento por debajo de los 30 °C en el envase perfectamente cerrado.
- ✓ Mantenga éste y cualquier medicamento fuera del alcance de los niños.

Ante una sobredosificación, concorra al hospital más cercano o comuníquese con:



- **Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247**
- **Hospital A. Posadas: (014) 4654-6648 / 4658-7777**
- **Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel: (0221) 451-5555**

CoFA
www.cofa.org.ar



TU FARMACIA