



COVID-19

la prevención está en nuestras manos



PROTOCOLO DE VACUNACIÓN



PROCEDIMIENTO PARA LA VACUNACIÓN

protocolo previo a la vacunación

1



Otorgar turnos y definir un horario especial de atención a pacientes preferentemente fuera del horario de atención a público general. Solicitar datos del paciente: apellido, nombre y N° afiliado y colocar carteles en la farmacia informando esta situación excepcional.

2



Disponer un lugar cómodo para la espera del paciente, donde se respeten las normas de distancia entre personas e higiene.

3



En caso de no poder asistir al turno previsto, el paciente deberá comunicarse con la farmacia para reasignar uno nuevo.

4



Al recibir al paciente, consulte sobre su condición de salud para evaluar que se encuentre físicamente apto para ser vacunado.

5



Si sospecha que el paciente puede portar la infección COVID-19, NO VACUNAR e implementar las medidas de seguridad adecuadas.

6



Si las condiciones de salud del pacientes son aptas para recibir la vacuna, se procederá a la vacunación.

procedimiento para la vacunación

1



Utilizar ambo, chaquetilla o guardapolvo, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar alcohol en gel o soluciones alcohólicas tópicas y secarse con papel desechable. Colocarse barbijo quirúrgico, mascarilla plástica y guantes descartables.

2



Disponer de un lugar apartado para las pertenencias del paciente y un trapo con lavandina en el piso donde pueda limpiar su calzado antes de ingresar al gabinete. Recomendamos que el paciente ingrese usando tapaboca/cobertor facial/barbijo de uso comunitario.

3



Disponer de la vacuna para la administración, limpiar la zona de aplicación con solución fisiológica y/o agua esteril, aplicar la vacuna según las indicaciones del prospecto y limpiar nuevamente la zona.

4



Abordar al paciente evitando la exposición frontal. Descartar la jeringa en el descartador de residuos patógenos.

Evitar tocarse la cara, en especial boca, nariz y ojos. Limpiar y desinfectar la zona destinada a la vacunación cada vez que se vacune. Recordar el procedimiento de retiro y descarte de mascarilla.

SI EL PACIENTE PRESENTA SÍNTOMAS TALES COMO RESFRÍO, MALESTAR GENERAL, FIEBRE, TOS, DOLOR DE CABEZA, ENTRE OTROS, **NO SE DEBE PROCEDER A LA VACUNACIÓN.**